



Artografia

Apelido:
Nome próprio:
Data de nascimento:

Caro/cara paciente

O seu médico solicitou um exame da sua articulação. Para aumentar o valor informativo do exame, é necessário injetar na articulação primeiro um meio de contraste.

Procedimento do exame

O meio de contraste é injetado pelo radiologista antes do exame de ressonância magnética (RM) ou de tomografia computadorizada (TC). Embora haja apenas uma pequena picada, a esterilidade tem de ser garantida. A região da articulação é desinfetada e coberta por um pano estéril. O local é dessensibilizado por uma anestesia local. Sob controle de raios X, a agulha é colocada na articulação onde é injetado o produto de contraste. A seguir, realiza-se o exame de RM ou TC propriamente dito.

Possíveis efeitos secundários

O meio de contraste pode provocar uma sensação de pressão na articulação que, no entanto, desaparece dentro de pouco tempo. Qualquer dor que ocorra na articulação deve ser breve. Lesões ou inflamações das estruturas circundantes são complicações muito raras e tratáveis.

Depois do exame

Recomendamos que no dia do exame não sobre carregue a articulação em questão. Colocamos um penso no local da injeção que deve ser removido apenas depois de terem passado 24 horas. Se o meio de contraste for injetado numa articulação da perna, deve evitar ter de conduzir o resto do dia.

Por favor, responda às seguintes perguntas.

Sofre de alergias? (meio de contraste, anestesia local...) Quais:	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não
Toma medicamentos para tornar o sangue mais fluido?	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não

Se tiver dúvidas ou gostaria de fazer uma pergunta, a nossa equipa está à sua disposição.

Pela presente confirmo que tomei conhecimento das informações e respondi às perguntas acima com verdade. Com a minha assinatura declaro o meu consentimento para o exame.

Data:

Assinatura do paciente:
(ou da pessoa responsável)

Visum Radiologiefachperson: